



دستور العمل نحوه کشیدن دارو از ویال

دستور دارویی را با کارت و کاردکس دارویی چک کنید.

مقدار مورد نیاز دارو را محاسبه کنید

به اصول درمانی توجه کنید.

وسایل را آماده کنید: کارت دارویی، سرنگ و نیدل مناسب، ویال دارویی، آب مقطر، پنبه، پنبه الکلی، برچسب دارویی، سینی و ظرف وسایل نوک تیز

دستها را بشویید

دستکش یکبار مصرف را بپوشید.

سرپوش ویال را برداشته و در صورت لزوم آن را ضدعفونی کنید.

ب: در صورتی که دارو به صورت محلول وجود دارد (ویال های چندبار مصرف) و ته نشین شده است، ویال را بین دو کف دست قرار داده و بچرخانید (تکان ندهید) تا دارو مجدداً حل شود.

الف: در صورتی که دارو بصورت پودری باشد، ابتدا سرنگ را برداشته و پس از تست آن 5cc آب مقطر و یا 10cc بر اساس نیاز کشیده (مطابق روش کشیدن دارو از آمپول) سپس آن را وارد ویال کنید، سپس نیدل را خارج نموده و ویال را بین دو کف دست قرار داده و بچرخانید تا دارو حل شود.

با رعایت نکات استریلیتی به اندازه حجم دارویی که بایستی کشیده شود، هوا وارد سرنگ کنید.

نیدل سرنگ حاوی هوا را وارد ویال کنید (و نه داخل محلول) و هوا را در آن تزریق کنید: سپس ویال را بین انگشت دست غیرغالب بگیرید، آن را وارونه کنید و به صورت عمود در سطح چشم قرار دهید، در تمام مدت مراقب باشید نوک سوزن از محلول خارج نشود و به اندازه مورد نیاز دارو را بکشید.

در هنگام کشیدن دارو در صورت وجود حباب، قبل از خارج کردن سرنگ، آن را در خود ویال تخلیه کنید.

سوزن را از ویال خارج کنید و درپوش را روی سوزن قرار دهید، روی یک برچسب نام دارو و تاریخ را قید و آن را روی سرنگ چسبانده سپس سرنگ را داخل جلد کاغذی خود قرار دهید بعد داخل جلد سرنگ قرار دهید. در صورتی که دارو باعث التهاب میشود و یا تزریق عضلانی است، نیدل را عوض کنید.

داروی کشیده شده را روی کارت دارویی مربوطه قرار دهید و همراه با پنبه الکلی داخل سینی بگذارید.

وسایل را جمع آوری کنید.

دستکش را بیرون بیاورید و دستها را بشویید.

داروی باقی مانده را مطابق مقررات و دستور مؤسسه ذخیره و نگهداری کنید.


تصاویر نحوه کشیدن دارو از ویال



دستکش تمیز بپوشید.



دست ها را بشویید




درپوش ویال را برداشته و در صورت لزوم آن را ضدعفونی کنید.




نمونه های ویال دارویی




نیدل را وارد ویال کنید و آب مقطر را داخل ویال تزریق کنید، سپس نیدل را خارج نموده و ویال را بین دو کف دست قرار داده و بچرخانید تا دارو حل شود.




در صورتی که دارو بصورت پودری باشد، ابتدا سرنگ را برداشته و پس از تست آن 5cc آب مقطر و یا 10cc بر اساس نیاز بکشید.




ویال را بین انگشت دست غیر غالب بگیرید، آن را وارونه کنید و به صورت عمود در سطح چشم قرار دهید، در تمام مدت مراقب باشید نوک سوزن از محلول خارج نشود و به اندازه مورد نیاز دارو را بکشید.



با رعایت نکات استریلیتی به اندازه حجم دارویی که بایستی کشیده شود، هوا وارد سرنگ کنید.



سوزن را از ویال خارج کنید و درپوش را روی سوزن قرار دهید، روی یک برچسب نام دارو و تاریخ را قید و آن را داخل جلد سرنگ قرار دهید.



در هنگام کشیدن دارو در صورت وجود حباب، قبل از خارج کردن سرنگ، آن را در خود ویال تخلیه کنید.